

# Применение препаратов ГЛИЦЕРОЛ на картофеле\*



марка, л/га ГЛИЦЕРОЛ	перед посевом	всходы, 1-2 листа	нарастание вегетативной массы	бутонизация	цветение	созревание
<b>КОМПЛЕКС</b>		1,0-1,5	1,0-1,5	1,0-2,0	<b>«+» Формирование комплексного питания культуры во время вегетации. Устойчивость к неблагоприятным условиям. Активизация роста. Стимуляция цветения. Увеличение масличности семян.</b>	
<b>КОМПЛЕКС АЗОТ</b>		0,5-1,0	0,5-1,0	1,0-1,5		
<b>ЦИНК</b>		0,5	0,5-1,0	0,5		
<b>БОР</b>		0,5	1,0-1,5	1,0-2,0		
<b>КАЛИЙ</b>	0,3-0,5 на тонну	0,5	1,0-1,5	1,0-1,5		

**Увеличение урожайности от 10-30 %**

\*Возможно применение одного вида или в комплексе из нескольких препаратов Глицерол, а так же в баковой смеси с пестицидами применяемыми в хозяйстве. Норма расхода и необходимые марки корректируются в зависимости от планируемой урожайности, содержания макро и микроэлементов на данном участке, учитываются результаты листовой диагностики и технологии возделывания принятой в хозяйстве.